望遠鏡観測部門報告 Report of Telescopic Meteor observations inJune,2005 No.256

担当幹事 殿村 泰弘(Tonomura Yasuhiro) 宮城県富谷町 (Tomiya-machi Miyagi-pref, Japan)

2005年 6月の望遠鏡観測の結果を紹介する予定でしたが、6月分の報告がありませんでした。


そこで今回は2001年の望遠鏡観測(双眼鏡・ナイトスコープ)の光度分布を紹介します。

なお4氏以外にも報告を寄せていただいていますが、ここで紹介する光度分布は、寺迫氏、殿村、佐藤達雄氏、渡辺氏の4氏のみに限っています。他の観測者の結果は、今後HP上で紹介していきます。

	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	Avg-Mag	Total
M.Terasako						0	0	0	4	4	0	24	37	65	39	7		9.62	180
Y.Tonomura		1	0	0	0	1	7	6	2	5	13	4	7	4	0			6.22	50
T.Satoh			4	6	17	41	97	158	47	2	0	0						3.35	372
S.Watanabe							0	3	2	2	6	9	15	22	7	0		8.79	66

(表-1) 2001年望遠鏡観測による光度分布

Table 1 Magnitude distributions of the Telescopic Meteor observations in 2001



4氏の使用している器械について紹介します。

T.Satou Nikon NS (1 x 40°)

M.Terasako 15cm x 25 2.7 ° Bino. 25cm x 35 2.4 ° L.T.

Y.Tonomura $5 \text{ cm} \times 7 7.3 \degree \text{ Bino}$. S.Watanabe $15 \text{ cm} \times 25 2.7 \degree \text{ Bino}$.

表やグラフを見れば分かるように,使っている器械によって,捉えている流星の光度の違いが分かる。ナイトスコープは,4等程度の流星を捉えやすい。5センチの双眼鏡では,7から8等の流星を捉えやすい。15センチ以上の口径では,10から11等の流星を捉えやすい。また,眼視観測でもあるように,観測者の流星を捕捉する能力,観測地の条件なども観測結果に影響するものと言える。13等の流星を以前寺迫氏が捉えていたが,それ以下の流星が存在するかは,未だに観測報告がありません。流星が「地球大気と衝突して発光する」現象である以上,あまり小さい流星物質では,「発光」が起きないかもしれません。

なお,寺迫氏と渡辺氏の個人別の月別の光度分布については,望遠鏡分科会のHP上で公開しています。