## 望遠鏡観測部門報告 Report of Telescopic Meteor observations in March,1998 No.170

担当幹事 殿村 泰弘(Tonomura Yasuhiro) 宮城県石巻市(Ishinomaki-shi Miyagi-ken, Japan)

1998年3月の望遠鏡観測の結果を(表-1)に示します。今月は2名の方から報告がありました。

## (表-1) 1998年3月の望遠鏡観測結果

Table 1 Summary of the Telescopic Meteor observations in March, 1998

観測	引 者	観 測 地	夜数	時間	流星	<b>星数</b> Me	eteor	備考		
0bse	erver	Locality	Night	Time	Plot	Seen	Total	Remarks		
寺迫	正典	静岡県引佐町	5	470	-	24	24	40cm×56 1.5° L.T. 15cm×25 2.7° Bino.		
渡辺	忍	静岡県焼津市	4	855	-	8	8	15cm×25 2.7° Bino.		
1998年	3月計		9	1, 325	0	32	32	HR = 1.4		
追加報行 1998年	与 2月分									
作間	幸太郎	山口県山口市	3	90	4	0	4	$5\mathrm{cm} \times 7$ 7.3° Bino.		

3月も2名の方から観測報告をいただきました。例年11月下旬から3月の中旬までは観測の稼ぎ時の時期になるのですが、今回は冬型が長続きせず、太平洋側で晴天が長続きしない一方で、日本海側でも天気が悪いという「四面楚歌」の状況で、思うように観測できませんでした。これからに期待したいものです。

さて、3月の各観測者の光度分布は、(表-2)に示すとおりです。

## (表-2) 3月の望遠鏡流星の光度分布

Table 2 Magnitude distributions of the Telescopic Meteors in March, 1998

観測者 (Observer)	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	L-Mag	Total	Avg Mag.
寺迫(Terasako.M) Spo. 40cmLT,15cmBino.												1	1	1	10	11		12. 5-13. 0	24	11. 21
渡辺(Watanabe.S) Spo. 15cm×25 2.7° Bino.									2	1		1	3	1				8.0 -11.5	8	7. 63
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	4	2	10	11	0		32	10. 31

## (表-3) 3月の望遠鏡流星の出現数変化

Table 3 Telescopic Meteors in March, 1998

Ul Table 5 lelescopic meteols in maich, 1996																
日	開始	JST	終了	JS T	分	中央時	観測方向	Р	S	Т	HR	Mag	See	C1		観測者 (Observer)
1	25	30	26	0	30	1.7	Dra, Cep	-	0	0	0	11.5	rG	0	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
1	26	0	27	0	60	1. 73	Cyg, Lyr	1	2	2	2	11.5	rG	0	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
1	27	0	28	0	60	1.77	Aql, Ser, Oph	ı	2	2	2	11.5	rG	0	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
1	27	20	29	20	120	1.81	Dra, Cyg, Cep	-	7	7	3. 5	12.5	rG		25cm L.T.	寺迫 (Terasako.M)
1	28	0	29	5	65	1.81	Oph, Sgr	-	0	0	0	9	rP	1	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
2	18	53	20	53	120	2. 45	Per, And, Psc	-	4	4	2	13	rG		40cm L.T.	寺迫 (Terasako.M)
7	28	3	29	18	75	7.82	Dra, Cyg, Cep	-	4	4	3. 2	12.5	rG		25cm L.T.	寺迫 (Terasako.M)
15	24	55	26	0	65	15. 69	UMi, Dra	-	1	1	0.9	10	M	3. 5	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
15	26	0	26	55	55	15. 73	Lyr, Cyg	1	0	0	0	8	P	8.5	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
17	24	45	26	0	75	17. 68	UMi, Dra, Cyg	-	0	0	0	10	M	0	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
17	26	0	27	0	60	17. 73	Cyg, Lyr, Aql	1	0	0	0	10	M	0	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
17	27	0	28	0	60	17. 77	Aql, Sct, Sgr	ı	1	1	1	8.5	rP	0	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
17	28	0	29	0	60	17.81	Sgr, Peg	-	1	1	1	8.5	rP	0	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
22	27	35	28	45	70	22.8	Dra, Cyg, Cep	-	5	5	4. 3	12.5	rG		25cm L.T.	寺迫 (Terasako.M)
30	24	35	25	0	25	30.66	Dra, Cep	-	0	0	0	10	M	0	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
30	25	0	26	0	60	30.69	Cep, Cyg	ı	0	0	0	10	M	0	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
30	26	0	27	0	60	30. 73	0ph, Sgr	-	1	1	1	10	M	0	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
30	27	0	28	0	60	30. 77	Cap, Aqr	-	0	0	0	10	M	0	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
30	27	21	28	46	85	30. 79	Dra, Cyg, Lyr	-	4	4	2.8	12.5	rG		25cm L.T.	寺迫 (Terasako.M)
30	28	0	29	0	60	30.81	Aqr, Peg	-	0	0	0	10	M	0	15cm Bino.	渡辺 (Watanabe.S)
	9	Nigh	t			1, 325	min	0	32	32	1. 4					

寺迫氏は, 今月も多くの暗い流星を観測されています。

次に3月の望遠鏡流星の出現数変化を(表-3)に示します。

先に述べたように冬型の気圧配置が長続きしないために、3月のの望遠鏡流星の出現状況を明らかにすることができなかった。天候に左右されるのが、自然現象を相手にする観測の宿命です。11月のしし群の時の天候を心配するのもそのせいです。

ところで、1月の望遠鏡部門報告の集計が違っていました。年度末で慌てて作成したために前月の観測報告が 混じったまま印刷してしまいました。訂正については別項の通りです。今後気をつけますのでお許し下さい。